



BROCHURE DESTINÉE AUX PATIENTS SUR Pr XIIDRA^{MD} ET LE PROGRAMME INITIÉ^{MC} de XIIDRA^{MD}

XIIDRA^{MD} est une solution de gouttes ophtalmiques sur ordonnance utilisée pour traiter les signes et les symptômes de sécheresse oculaire.

La présente brochure vous permettra de bien entamer votre traitement par XIIDRA^{MD}, et de comprendre le programme d'assistance financière de XIIDRA^{MD}.

BAUSCH + LOMB

Jetez un coup d'œil à l'intérieur

Pourquoi m'a t-on prescrit XIIDRA ^{MD} ?	3
Programme iinité ^{MC} de XIIDRA ^{MD}	4-5
Prendre XIIDRA ^{MD}	6-7
Comment utiliser XIIDRA ^{MD}	8-10
Renseignements importants sur l'utilisation sécuritaire	11
Accès rapide au programme iinité ^{MC} de XIIDRA ^{MD}	12




Pourquoi m'a t-on prescrit XIIDRA^{MD} ?

Les gouttes XIIDRA^{MD} servent à traiter les signes et symptômes de sécheresse oculaire. XIIDRA^{MD} agit en bloquant l'interaction entre deux types de protéines susceptibles de déclencher l'inflammation associée à la sécheresse oculaire.

Les symptômes courants de sécheresse oculaire sont :



Sécheresse



Sensation de sable dans les yeux



Picotements




Vision brouillée occasionnelle



Brûlure



Irritation et inconfort



Fatigue oculaire



Larmolement



Commencez avec le programme iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD}



Vous pouvez épargner jusqu'à 120 \$ par boîte de XIIDRA^{MD}*.



Pour de plus amples renseignements : myrx.care/fr/bausch-lomb

* Dans certains cas, le programme iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD} peut être jumelé à votre régime d'assurance privé. L'offre du programme iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD} peut être modifiée ou annulée par Bausch + Lomb sans préavis.

Visitez le site www.xiidra.ca pour de l'information à jour sur cette offre.

3 ÉTAPES FACILES

Inscription au programme iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD} :

1

1. Inscrivez-vous en ligne

- Rendez-vous sur le site myrx.care/fr/bausch-lomb
- Entrez le code d'accès « **XIIDRA** »
- Remplissez les informations d'inscription

2

2. Obtenez votre d'identification de membre

- Votre **d'identification unique de membre unique** sera généré instantanément
- Notez-le ci-dessous pour le garder dans votre portefeuille, l'imprimer ou en faire une capture d'écran afin de pouvoir y accéder facilement

3

3. Montrez-le à votre pharmacien

- Présentez votre **d'identification de membre** à la pharmacie pour bénéficier de vos réductions

Programme d'aide financière de iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD} – Identification de membre

Après vous être inscrit au programme iinitié^{MC}, inscrivez votre **d'identification de membre** ici et présentez-le à votre pharmacien :

Identification de membre :

Apportez cette carte avec vous à la pharmacie.



Prendre XIIDRA^{MD}

Avec XIIDRA^{MD}, les symptômes de sécheresse oculaire pourraient être soulagés en à peine 2 semaines chez certains patients.

CONSEIL UTILE !

Il est important d'utiliser vos gouttes XIIDRA^{MD} tous les jours.

Essayez de les utiliser juste avant de vous brosser les dents, matin et soir. Cela peut vous aider à ne pas oublier et peut également atténuer tout goût désagréable.



Dose



Deux fois par jour, tous les jours.

Appliquez une goutte de XIIDRA^{MD} dans chaque œil, deux fois par jour, à intervalle de 12 heures.



Chaque flacon d'XIIDRA^{MD} contient une quantité suffisante pour une dose dans les deux yeux. Il se peut qu'il reste un peu de solution au cas où une goutte ne toucherait pas votre œil.

Il vous faudra deux récipients par jour : un le matin et un le soir.



À utiliser immédiatement après ouverture, puis jeter le flacon et toute solution non utilisée. Ne pas conserver pour une utilisation ultérieure.

Lentilles cornéennes

Retirez-les avant d'utiliser XIIDRA^{MD}, puis attendez au moins 15 minutes avant de les remettre.

Dose oubliée

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Si c'est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et utilisez la dose suivante à l'heure prévue.

Veuillez consulter la page 11 pour obtenir des renseignements importants sur l'innocuité

Comment utiliser XIIDRA^{MD}




Préparez-vous

Avant d'utiliser XIIDRA^{MD}, lavez-vous bien les mains, et si vous portez des lentilles cornéennes, enlevez-les. Vous pourrez les remettre 15 minutes après avoir appliqué vos gouttes.

01. Sortez une fiole du sachet

- Sortez un sachet d'aluminium de la boîte de XIIDRA^{MD}
- Ouvrez le sachet et en sortez la bande de fioles à usage unique
- Détachez 1 fiole de la bande




02. Conservez les autres fioles pour plus tard

- Remettez les autres fioles dans le sachet
- Repliez ensuite le bord du sachet pour le fermer




03. Tapotez la fiole

- Tenez la fiole en position verticale
- Tapotez le haut de la fiole jusqu'à ce que toute la solution soit au bas de la fiole



04. Tournez le capuchon pour l'ouvrir

- Tournez la languette pour ouvrir le contenant
- Assurez-vous que l'extrémité de la fiole à usage unique ne touche à rien (afin d'éviter toute contamination)



05. Penchez la tête vers l'arrière et tirez la paupière vers le bas

- Penchez la tête vers l'arrière
- Si vous êtes incapable de pencher la tête, allongez-vous
- Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas et regardez vers le haut



06. Pressez doucement une goutte

- Placez l'extrémité de la fiole près de l'œil, sans qu'elle entre en contact avec celui-ci
- Pressez légèrement sur la fiole
- Laissez 1 goutte tomber dans l'espace entre votre paupière inférieure et votre œil
- Si une goutte tombe à côté de l'œil, essayez à nouveau




07. Répétez pour l'autre œil

- Répétez les étapes 5 et 6 pour l'autre œil
- Chaque fiole renferme assez de XIIDRA^{MD} pour les deux yeux




08. Pour terminer

- Après avoir appliqué 1 goutte dans les deux yeux, jetez la fiole ouverte et tout produit qu'elle contient
- Si vous portez des lentilles cornéennes (verres de contact), attendez au moins 15 minutes avant de les remettre



09. C'est fini

- Répétez les étapes 1 à 8 environ 12 heures après votre première administration de XIIDRA^{MD} de la journée (administrez une goutte de XIIDRA^{MD} dans chaque œil, deux fois par jour, à environ 12 heures d'intervalle)



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE DE XIIDRA^{MD}

Parlez à votre spécialiste des soins de la vue ou à un autre professionnel de la santé

Parlez de tous vos états de santé, y compris si :

- Vous êtes enceinte ou planifiez l'être
- Vous allaitez ou planifiez allaiter

Autres mises en garde à connaître :

- XIIDRA^{MD} peut temporairement brouiller votre vision quand vous mettez les gouttes. Si votre vue est brouillée, attendez que votre vision redevienne normale pour conduire ou utiliser une machine.

Effets indésirables possibles liés à XIIDRA^{MD}

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- Irritation de l'œil, douleur dans l'œil et/ou réaction de l'œil lors de l'application des gouttes dans les yeux
- Goût déplaisant

Les autres effets indésirables courants sont :

- Vision brouillée
- Larmoiement accru
- Démangeaisons dans les yeux
- Mal de tête
- Sensibilité à la lumière
- Rougeur des yeux

Arrêtez de prendre XIIDRA^{MD} et consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de réaction allergique tels que :

- Difficulté à respirer ou à avaler
- Enflure de la langue, des lèvres ou du visage
- Éruption cutanée, démangeaisons et urticaire

Si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou que celui-ci s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, dites-le à votre professionnel de la santé.

Pour plus d'information sur XIIDRA^{MD} :

- Consultez votre professionnel de la santé
- Consultez la notice **Renseignements pour les patients sur le médicament** incluse dans chaque boîte de XIIDRA^{MD}



Commencez avec le programme iinitié^{MC} de XIIDRA^{MD}

Vous pouvez épargner jusqu'à 120 \$ par boîte de XIIDRA^{MD}



Visitez le site
myrx.care/fr/bausch-lomb

OU



Balayez le **code QR**

Veuillez entrer le code d'accès « **XIIDRA** » à la première étape de la page d'inscription.

Si vous bénéficiez d'une couverture d'assurance privée partielle, vous êtes tout de même admissible à ce programme de soutien aux patients. Informez-vous auprès de votre pharmacien pour obtenir des directives.

Obtenez **GRATUITEMENT** 1 bouteille de Soothe^{MD} traitement pour les yeux secs sans agents de conservation avec la provision de votre prochain mois de traitement par XIIDRA^{MD}!

Le traitement pour les yeux secs sans agents de conservation Soothe^{MD} pourrait ne pas vous convenir. Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi.

Pour de plus amples renseignements :
myrx.care/fr/bausch-lomb

.....

BAUSCH + LOMB

Bausch + Lomb Corporation

520, Applewood Crescent | www.bausch.ca/fr-ca
Vaughan (Ontario) L4K 4B4 | Téléphone : 1-888-459-5000

XDR.0008.CA.24-FR

XIIDRA^{MD} est une marque déposée de Bausch + Lomb.

© 2026 Bausch + Lomb Corporation. Tous droits réservés.

